

Finella pupoides Adams A., 1860

Scheda tassonomica:	
Classis	Gastropoda Cuvier, 1797
Ordo	Neotaenioglossa Haller, 1882
Superfamiglia	
Familia	Obtortionidae Thiele, 1925
Subfamiglia	
Genus	<i>Finella</i> Adams A., 1860
Subgenus	
specie	<i>pupoides</i> Adams A., 1860
subspecie	

Scheda descrittiva:	
Sinonimi	
Descrizione	Conchiglia, come suggerisce il nome, pupoide, a spira elevata, costituita da 7 giri convessi. L'ornamentazione è data da strie assiali e spirali che formano un blando e non rilevato reticolo. La colorazione è bianca lucente con una fascia spirale a flammule marroncine, due sull'ultimo giro. La bocca è più piccola del diametro maggiore dell'ultimo giro.
Dimensioni	
Area di distribuzione e habitat	Specie lessepsiana. Il primo ritrovamento in Mediterraneo è del 1958, ad Haifa, Israele (Barash & Danin, 1977), poi Turchia (Engl, 1995) e Cipro (Buzurro & Greppi, 1997), prima segnalazione per le coste italiane Otranto (LE) (Trono, in stampa).
Descrizione originale	
Riferimenti bibliografici	<ul style="list-style-type: none"> - Barash A. & Danin Z., 1977. Additions to the knowledge of Indo-Pacific Mollusca in the Mediterranean. <i>Conchiglie</i>, 13 (5-6): 85-116; - Engl W., 1995. Specie prevalentemente lessepsiane attestate lungo le coste turche. <i>Bollettino Malacologico</i>, Milano, 31 (1-4): 43-50; - Buzurro & Greppi, 1997. Note e considerazioni sui molluschi di Cipro con particolare riguardo alle specie alloctone. <i>La Conchiglia</i>, Roma, 29 (283): 21-31; - Trono D, in stampa. Contributo alla conoscenza dei molluschi conchiferi del Salento (Lecce, Italia).
Riferimenti on line	
Comparazione	
Note	
Redattore	Scheda di Daniele Trono – Aggiornamento 01/10/2006

Riferimenti fotografici		
		
Foto 1		