



Monophorus erythrostoma (Bouchet & Guillemot, 1978)

Scheda tassonomica:	
Classis	Gastropoda Cuvier, 1797
Ordo	Neotaenioglossa Haller, 1882
Superfamilia	
Familia	Triphoridae Jousseaume, 1884
Subfamilia	Triphorinae Gray, 1847
Genus	<i>Monophorus</i> Grillo, 1877
Subgenus	
specie	<i>erythrostoma</i> (Bouchet & Guillemot, 1978) [Tryphora]
subspecie	

Scheda descrittiva:	
Sinonimi	
Descrizione	<p><u>Secondo Bouchet (1985):</u> Animale a grosse macchie rosso-vinaccia che coprono la testa e il piede. Conchiglia adulta costituita da una protoconca di 3,5 spire e da 10-15 spire di teleoconca. Protoconca bruna e teleoconca bruna rossastra, strettamente monocroma. Scultura formata da tre cordoni spirali: i cordoni 1 e 3 compaiono per primi, il cordone 2 compare successivamente verso il 10°-11° giro. Il quarto cordone è nascosto su tutta la spira ma compare all'altezza dell'apertura; esso è granuloso come il primo cordone basale; il secondo cordone basale è liscio. Dietro il peristoma possono apparire dei cordoni soprannumerari, solo nei grandi adulti che superano gli 8-10 mm. Peristoma svasato; incisione del canale posteriore poco netta e molto aperta: labbro interno ispessito; canale sifonale allungato e chiuso alla base.</p>
Dimensioni	Oltre 10 mm
Area di distribuzione e habitat	Mediterraneo e Golfo di Guascogna, Dalla Bretagna verso Nord; il limite africano della distribuzione non è noto.
Descrizione originale	
Riferimenti bibliografici	BOUCHET P., 1984. Les Triphoridae de Mediterranee et du proche Atlantique (Mollusca, Gastropoda). <i>Lavori SIM</i> , 21 : 5-58. (Traduzione a cura di Alberto Lubiani)
Riferimenti on line	
Comparazione	
Note	Altre notizie 
Redattore	Scheda di Daniele Trono – Aggiornamento 11/10/2006

Riferimenti fotografici		
		
Foto 1		