

## *Monophorus thiriota* (Bouchet, 1985)

<b>Scheda tassonomica:</b>	
<b>Classis</b>	Gastropoda
<b>Ordo</b>	Neotaenioglossa Haller, 1882
<b>Superfamilia</b>	
<b>Familia</b>	Triphoridae Jousseaume, 1884
<b>Subfamilia</b>	Triphorinae Gray, 1847
<b>Genus</b>	<i>Monophorus</i> Grillo, 1877
<b>Subgenus</b>	
<b>specie</b>	<i>thiriota</i> (Bouchet, 1985)
<b>subspecie</b>	

<b>Scheda descrittiva:</b>	
<b>Sinonimi</b>	
<b>Descrizione</b>	Vedi descrizione originale
<b>Dimensioni</b>	
<b>Area di distribuzione e habitat</b>	Locus typicus: Punta de la Revellata, baia di Calvi, Corsica.
<b>Descrizione originale</b>	<p><u>Estratto dalla descrizione originale di Bouchet (1985):</u>          Animale a grosse macchie rosso-vinaccia che coprono la testa e il piede [...].          Conchiglia adulta costituita da 3,75 giri di protoconca e 12 di teleoconca.          Protoconca bruna; teleoconca bruna bicolore: il colore del fondo e dei tubercoli è bruno caramello chiaro, mentre quello degli spazi intergranulari dei cordoni spirali è bruno nero. [...]</p> <p>Scultura formata da tre cordoni spirali: i cordoni 1 e 3 compaiono per primi, il 2 appare verso l'ottavo giro. Il quarto cordone è nascosto su tutta la spira ma compare all'altezza dell'apertura; questo cordone è granuloso. Il primo cordone basale è leggermente granuloso, il secondo totalmente liscio. [...] Normalmente manca il cordone soprannumerario dietro il peristoma. Peristoma svasato; incisione del canale posteriore poco netta e molto aperta: labbro interno molto spesso; canale sifonale ben sviluppato e chiuso alla base.</p>
<b>Riferimenti bibliografici</b>	BOUCHET P., 1984. Les Triphoridae de Mediterranee et du proche Atlantique (Mollusca, Gastropoda). <i>Lavori SIM</i> , <b>21</b> : 5-58. (Traduzione a cura di Alberto Lubiani)
<b>Riferimenti on line</b>	
<b>Comparazione</b>	
<b>Note</b>	
<b>Redattore</b>	Scheda di Daniele Trono – aggiornamento del 07/10/2006

<b>Riferimenti fotografici</b>		
Foto 1		