

## *Strobiligera brychia* (Bouchet & Guillemot, 1978)

<b>Scheda tassonomica:</b>	
<b>Classis</b>	Gastropoda Cuvier, 1797
<b>Ordo</b>	Neotaenioglossa Haller, 1882
<b>Superfamilia</b>	
<b>Familia</b>	Triphoridae Jousseaume, 1884
<b>Subfamilia</b>	Triphorinae Gray, 1847
<b>Genus</b>	<i>Strobiligera</i> Dall, 1924
<b>Subgenus</b>	
<b>specie</b>	<i>brychia</i> (Bouchet & Guillemot, 1978) [Triphora]
<b>subspecie</b>	

<b>Scheda descrittiva:</b>	
<b>Sinonimi</b>	
<b>Descrizione</b>	<p><u>Secondo Bouchet (1985):</u>          Protoconca e teleoconca di colore bruno-giallastro, monocrome; i tubercoli, talvolta consunti, possono apparire grigiastri.          Protoconca con due robuste carene spirali e delle coste assiali leggermente sigmoidi, discontinue al di sotto della prima carena.          Teleoconca a spire quasi piane, suture indistinte. Scultura ormata da tre cordoni spirali: i cordoni 2 e 3 appaiono fin dall'inizio, il n. 1 tardivamente. Il quarto cordone appare sotto forma di un lieve filetto sopraturale, pienamente visibile a livello dell'ultima spira. È liscio come il secondo cordone basale, situato immediatamente al suo disotto. Non ci sono cordoni soprannumerari dietro il peristoma.          Peristoma non svasato; incisione del canale posteriore indistinta; canale sifonale corto e aperto.</p>
<b>Dimensioni</b>	Intorno ai 30 mm, ma gli esemplari atlantici probabilmente possono raggiungere dimensioni maggiori.
<b>Area di distribuzione e habitat</b>	Dal Golfo di Guascogna al Marocco e Mediterraneo occidentale, Azzorre.
<b>Descrizione originale</b>	
<b>Riferimenti bibliografici</b>	BOUCHET P., 1984. Les Triphoridae de Mediterranee et du proche Atlantique (Mollusca, Gastropoda). <i>Lavori SIM</i> , <b>21</b> : 5-58. (Traduzione a cura di Alberto Lubiani)
<b>Riferimenti on line</b>	
<b>Comparazione</b>	
<b>Note</b>	
<b>Redattore</b>	Scheda di Daniele Trono – aggiornata al 15/10/2006

<b>Riferimenti fotografici</b>		
Foto 1		