

Tonna galea (Linné, 1758)

| Scheda tassonomica: | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Classis | Gastropoda Cuvier, 1797 |
| Ordo | Neotaenioglossa Haller, 1882 |
| Superfamilia | Tonnoidea Suter, 1913 (1825) |
| Familia | Tonnidae Suter, 1913 (1825) |
| Subfamilia | |
| Genus | <i>Tonna</i> Brunnich, 1771 |
| Subgenus | |
| specie | <i>galea</i> (Linné, 1758) [Buccinum] |
| subspecie | |

| Scheda descrittiva: | |
|--|---|
| Sinonimi | = <i>Buccinum olearium</i> Linné, 1758 |
| Descrizione | <p><i>Tonna galea</i> è una delle specie di molluschi più grandi nel mediterraneo, più rara in alcune zone che in altre. Ha forma globosa quasi sferica, con spira poco elevata, molto leggera e fragile. Gli ultimi giri ricoprono in parte i primi, creando una sutura abbastanza profonda e canalicolata. Non vi è callo columellare, ma è presente un piccolo ombelico profondo; il canale sifonale è breve e tagliente; il labbro esterno quasi tagliente è ondulato dal tipo di ornamentazione spirale che è costituita da un alternarsi da cordoni grossi e fini, tranne nella parte anteriore ove sono tutti, o quasi, grossi. La colorazione è crema-beige senza alcun tipo di disegno; l'interno del labbro esterno può presentarsi di un marrone scuro; l'apice invece è quasi sempre di un viola carico. Manca l'opercolo.</p> <p>L'animale, che si nutre di echinodermi, secerne dalla ghiandola dell'intestino acido aspartico e solforico e, mediante la lunga proboscide, immobilizza la preda. Abbastanza carnoso, di colore chiaro con venature più scure, è talmente grande da non poter essere ritratto completamente all'interno della conchiglia stessa</p> |
| Dimensioni | 160 – 250mm |
| Area di distribuzione e habitat | <p>La specie è cosmopolita, ad eccezione dei poli; è comune in alcuni mercati ittici ma è specie la cui raccolta è vietata dalla legge italiana.</p> <p>Predilige fondali sabbiosi o anche praterie di posidonia ed è reperibile, di norma, sino a 120-130 metri.</p> |
| Descrizione originale | |
| Riferimenti bibliografici | Giannuzzi-Savelli R., Pusateri F., Palmeri A., Ebreo C, - 2002 – Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo – Ed. Evolver – Vol.2 p.204 |
| Riferimenti on line | http://www.trockenaquaristik.de/tr_057_tonna_galea.html http://www.jaxshells.org/tunfin.htm |
| Comparazione | Specie facilmente confondibile con <i>Tonna olearium</i> , che però è esclusivamente Indo-pacifica, di colore più scuro, con spira molto più elevata e con cordoni sempre alternati. |
| Note | |
| Redattore | Scheda di Marco Sanniu – aggiornata al 14.10.2006 |

| Riferimenti fotografici | | |
|-------------------------|--|--|
| Foto 1 | | |