

ζ. *ferussaci* Moq., pl. IV, f. 5. — Fér, pl. IV, f. 8.

A. albidus, *clypeo maculis rotundatis nigris, dorso maculis nigris rotundatis subscriato*.

Hab. - Lombardia (Pini), Toscana (Paulucci), - Sardegna (Genè), Calabria (Paulucci).

η. *fasciatus* Moq., - Lessona, tav. II, f. 8.

A. fusco-cinereus vel nigricans, *clypeo irregulariter albido-luteo maculato; dorso longitudinaliter albido-luteo zonato*.

Hab. - Piemonte.

È incomprendibile come Moquin-Tandon abbia potuto credere di vedere nel cappuccio di questa specie due ordini di strie concentriche con due centri distinti, come dimostra chiaramente la sua fig. 1 della tav. IV.

Limax genei nobis, tav. 1, f. 1.

L. magnus, *rugosus*, *usque ad* $\frac{2}{3}$ *dorsi obtuse carinatus; clypeo magno, subgibboso, postice cuneato; apert. pulmon. pallide marginata. Colore pallide-brunneo, dorso subfusco, zonis 3 ochraceis, et prope carinam utrinque punctis nigris breviterisato; clypeo brunneo-subfusco, postice ochraceo obsolete trizonato, antice punctis nigris rotundatis sparso; capite tentaculisque pallidis. Solca unicolore? — Longit. 18 cent.*

Questa specie fu trovata in Sardegna dal Prof. Genè, al quale è dedicata; la descrizione è fatta sopra una figura eseguita nel 1838 dall'animale vivo, e sopra un esemplare del Museo di Torino conservato nell'alcool. I punti neri sussistono ancora dopo più di 50 anni, ma il resto del corpo è scolorito, per cui non si può sapere se le zone della suola erano o no unicolori. Sul sommo del dorso e lungo la carena si vedono le serie di rughe più piccole come nel *corsicus*. Si distinguerà questa specie per la macchiatura curiosa del cappuccio; in esso la tinta fondamentale è bruna, nella metà posteriore vi sono tre fascie confuse ocraceo-chiare, una nel mezzo, una attorno all'apertura polmonare, ed una dall'altra parte; nella parte anteriore invece è sparso di piccole macchie nere rotonde, e di queste una o due si trovano lontane dalle altre nel mezzo del cappuccio.

Hab. - In Sardegna alla Tanca Ressa, provincia di Sassari.

Limax unicolor Heynemann.

Limax cinereus var. ♂ Müll. Verm. hist. II, 1774, p. 7.

Limax unicolor Heynem. Malakozool. Blätt. 1862, p. 55. — Westerlund, Fauna europ. moll. extram. 1876, p. 8.

L. magnus, *mediocriter rugosus, brevi et obtuse carinatus: clypeo magno non gibboso, postice acute angulato, unicolore (in iuvent. minutissime intense punctulato);*